

FICHA TÉCNICA
BIOFERTILIZANTE
TIPO BOCASHI
SÓLIDO

ELABORADO POR

ANDISOIL



ANDISOIL

contacto@andisoil.com

+569 61942623



DESCRIPCIÓN GENERAL

Biofertilizante de aplicación directa a suelo. Contiene nutrientes minerales, alta carga de Materia orgánica y Microorganismos, como producto de la fermentación o descomposición aeróbica (con oxígeno) de desechos orgánicos y materias primas minerales.

Contiene una excelente actividad biológica, microflora, hongos y levaduras que serán un excelente complemento a suelos improductivos o desgastados.

ALGUNOS BENEFICIOS

- Promueve las actividades fisiológicas y estimula el crecimiento y desarrollo de las plantas.
- Aumenta el rendimiento y mejora la calidad de los productos.
- Producto de la actividad Microbiológica pone a disposición de las plantas los macro y micro nutrientes existentes en el suelo.
 - Estimula el crecimiento de sus raíces y follaje.
 - Se reduce la acidez de los suelos.
- Se contribuye a la conservación del suelo, existe mayor captación de agua lluvia, disminuye el calor ambiental y se protege la biodiversidad

contacto@andisoil.com

+56961942623



ESPECIFICACIONES

CARGA NUTRICIONAL

Nitrógeno	... 1.12%
Fósforo ppm	... 1700
Potasio (m eq/100gr.)	... 172.3
PH:	... 7.6
Materia Orgánica	... 23 %
Calcio (m eq/100gr.)	... 623.2
Boro ppm	... 5.83
Hiero (Fe) ppm	... 0.5
Manganeso ppm	... 3.06

ANDISOIL



DOSIFICACIÓN

DÓISIS Y APLICACIÓN IDEAL

- **Almácigos:** Hacer una mezcla con $\frac{1}{3}$ de bocashi y tierra del lugar, puede agregar perlita, arcilla o arena.

- **Suelos degradados,** aplicar 4 kg. por metro cuadrado.

** La aplicación debe realizarse 15 días antes de la siembra, al trasplante o en el desarrollo del cultivo.

- **Cultivos anuales:** realizar una segunda aplicación, entre 15 y 25 días de la emergencia del cultivo, en dosis de 1 kg. por metro cuadrado.

- **Frutales:** se aplica una 0,5 kg. al momento de la siembra y tres aplicaciones de 0,5 kg. por año, durante el período de crecimiento. En árboles productivos se harán aplicaciones de 1 kg., tres veces por año.

Hortalizas: una aplicación de 2 kg. por metro cuadrado, 15 días antes de la siembra o el trasplante